

ÈæÇÓØÉ:

ãÔÑ Ýí : 2010/3/16 16:30:00

ÈæÇÓØÉ ÇáããäíÓ / ÚííÇáäíÓä ÇáÓÑíÚ
ÊÇÑíí 16/3/2010

ãä ÇáØíæÑ ÇáíäíáÉ ÇáÊí ÊÒæÑ æÊÚÈÑ ÇáÈáÇí Ýí åÐå ÇáÁíÇä æáåÇ ÔåÑÉ æÇÓÚÉ Ýí ääØÐÉ ÇáìÒíÑÉ ÇáÚÑÈíÉ åæ ÇáØÇÆÑ ÇáÐØÐÇØ ÇáÐÒæíäí (íäíÑÉ ÕíæÑ) Caspian Plover (Charadrius asiaticus (æÚái ÇáÑÚä ää ÇáÕíí ÇáìÇÆÑ ÇáÊí ÊÊÚÑÖ áå ää ÐÈá ÈÚÖ ÇáÕíÇííä ÇáÐíä áÇ ää áää Óæì ÇáÕíí æÈÓ ÁáÇ Åää áÇ ÊÒÇá ÊÚÈÑ äää ÅÚíÇí áÇ ÈÁÓ ÈåÇ æái ÊíÇæá Åä ÊÊíäÈ ÐíÑ ÇáãÓÊØÇÚ ääÇØÐ ÇáÐÈá æÇáÕíí Ýí ÇáÐæíÊ æÇáìÒíÑÉ ÇáÚÑÈíÉ .

ÇáØÐØÇÐ ÇáÐÒæíäí (ÐΒÑ)

ØÇÆÑ ÇáØÐØÇÐ ÇáÐÒæíäí ää ÇáØíæÑ ÇáãäÇìÑÉ ÇáÚÇÈÑÉ ÔÊÇÁÇ æái ÊÐíä æÊÝÑí Ýí Çáíæá ÇáãØáÉ Úái ÊíÑ ÐÒæíä æÓØ ÅÓíÇ æåÐå Çáíæá äí (ÊÑΒäÇäÓÊÇä æΒÇÒíÓÊÇä æÁíÑÇä æÑæÓÓíÇ æÅÐÑÈíÇä) æÐí Óäíä åÐÇ ÇáØÇÆÑ ÊÇáØÐØÇÐ ÇáÐÒæíäí ÈåÐÇ ÇáÇÓä äÓÊÉ Áái ÊíÑ ÐÒæíä ÇáÐí íÊæÇíí æíÊΒÇÈÑ ÊÇáÐÑÈ ää ÓæÇíáå ÈΒÈÑÉ .

íÚíÖ åÐÇ ÇáØÇÆÑ Ýí ÇáÓåæá æÇáÅæííÉ æÇáÅÑÇÓí ÇáãäÈÓØÉ æåæ ØÇÆÑ ÇíÊäÇÚí ÇáØÈÚ íÒæÑ ÈÅÚíÇí æäìÇáíÚ ΒÅääÇ ÅÓÑÉ Åæ ÚÇÆáÉ æÇííÉ , ÊÊÚÐì Úái ÇáÈÐæÑ æÇáíÒÑÇÊ , íäÊäíÒ áæä ÇáÐΒÑ Èáæä ÒåÑí äíäÑ äÈá ÇáØæÐ Úái ÕíÑä , æåæ ÓÑíÚ ÇáØíÑÇä æÇáäÕí Úái ÇáÅÑÖ .

ÇáØÐØÇÐ ÇáÐÒæíäí (ÅäÈì)

äìææÚÉ ää íäíÑÉ ÕíæÑ

ÒÑÝ (ØÇíÑ) ÍäíÑÉ ŐİæÑ